



DR. BRUNNER

Marie-Jeanne | FÄ für Anästhesie und Intensivmedizin
Ärztin für Allgemeinmedizin | Notärztin

ALLGEMEINE Patienten INFO

Analgoosedierung - Erwachsene

Sehr geehrte Patientin !

Sehr geehrter Patient !

Ich arbeite nach dem Wahlarzt- Prinzip (d.h. **kein** Kassenvertrag). Sie erhalten im Rahmen des Aufklärungsgespräches eine Honorar-Rechnung. Diese können Sie bei ihrer Krankenkasse bzw. Privaten Zusatzversicherung zur Abrechnung vorlegen.

Die Rechnung ist bitte **VOR** dem geplanten Eingriff zu begleichen. Sollte es zu Abweichungen (kürzere bzw. Längere OP-Dauer als geplant) kommen, wird diese selbstverständlich angepasst . Zur Verrechnung gelangt die Anästhesie Dauer (**NICHT** OP-Dauer) .

Die 1.Stunde wird mit € 300 .- beziffert, anschließend wird halbstündlich verrechnet.

Die Honorarnote setzt sich aus Facharzt-Konsultation, Aufklärungsgespräch, Narkose (Medikamente/Equipment) , Hin-und Wegfahrt, sowie Nachbetreuung zusammen.

Bestimmte chirurgische Eingriffe können unter örtlicher Betäubung (**Lokalanästhesie** durch den Chirurgen) durchgeführt werden.

Als Kombinationsverfahren bietet sich hier ein medikamentös eingeleiteter dämmerenschlafartiger Zustand (**Analgoosedierung**) an, der durch seine entspannende, angstreduzierende und schmerzlindernde Wirkung Ihren Komfort deutlich erhöhen wird.

Dazu ist das Setzen eines venösen Zugangs notwendig, um diese Medikamente verabreichen zu können. Der Unterschied zur Allgemeinanästhesie ist, dass Sie einerseits weckbar bleiben und andererseits Ihre Atmung erhalten bleibt.

Das Erinnerungsvermögen an den Eingriff selbst ist meist eingeschränkt, aber nicht vollständig erloschen.

Da der Übergang zu einem narkoseartigen Zustand fließend sein kann , können manchmal die Maßnahmen einer Allgemeinnarkose (wie *künstliche Beatmung, Atemwegssicherung*) notwendig werden. Es gelten daher die gleichen Kriterien wie bei einer Allgemeinnarkose (Vorbereitung, OP Freigabe, Überwachung der Herz-Kreislauffunktion).

Ich als Ihre Anästhesistin betreue Sie daher vor-während und nach dem Eingriffs durchgehend